漢方製剤の柴苓湯(TJ-114, 生薬の柴胡と茯苓の配合) による肝障害

相場常男*、高橋 徹*、鈴木健二*、大越省吾*、 野本 実*、宇野勝次、青柳 豊*

Journal of Gastroenterology and Hepatology, 22, 726-763 (2007)

Liver injury induced by a Japanese herbal medicine, sairei-to (TJ-114, Bupleurum and Hoelen combination, Chai-Ling-Tang)

Tsuneo Aiba*, Toru Takahashi*, Kenji Suzuki*, Shogo Okoshi*, Minoru Nomoto*, Katsuji Uno and Yutaka Aoyagi*

ABSTRACT: The case is reported of a man who showed acute hepatitis with jaundice after he was given a Japanese herbal medicine, sairei-to (TJ-114, Bupleurum and Hoelen Combination, Chai-Ling-Tang). Unusually, the component thought to be responsible for the observed drug-induced liver injury was able to be identified. Lymphocyte migration inhibition testing indicated that the tuber of the perennial herbage *Pinellia ternate* was the causative agent.

抄録 漢方製剤の柴苓湯 (TJ-114, 生薬の柴胡と茯苓の配合)を投与された後、黄疸 を伴う急性肝炎を発現した男性の症例報告をする。特に、観察された薬剤性肝障害の 原因と考えられる構成成分を同定することができた。白血球遊走阻止試験は多年草の カラスビジャクの茎が原因薬物であると示した。

 * Division of Gastroenterology and Hepatology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University 新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野